

Группа нозологического риска – обособленная группа лиц, определённым образом выделяемая в связи с наличием у них определённых общих факторов нозогенного риска, то есть риска возникновения заболеваний, иных расстройств и нарушений здоровья. В данной группе должно планироваться и осуществляться проведение соответствующих целевых валеологических, гигиенических, медико-профилактических и дополнительных диагностических мероприятий (каких именно – зависит от того, какого конкретно характера риски ОНЗ определены предварительно в данной группе нозологического риска).

Группа высокого нозологического риска – определённая группа лиц, объединённая одним общим характерным нозогенным признаком – максимально высокими потенциальными значениями реализации факторов риска основных неинфекционных заболеваний (или сочетанных факторов риска ОНЗ). Поэтому лица данной группы имеют наибольшую вероятность (фактический риск) возникновения случаев сердечно-сосудистых, онкологических, эндокринных, желудочно-кишечных и других основных неинфекционных заболеваний. При этом, как правило, высокий нозологический риск статистически и корреляционно сопряжён с высоким риском катастрофического исхода заболевания в ближайшее время.

Опубликовано в составе монографии:

УДК 616-084

ББК 51.1(2)5

A23

[Терминология профилактической медицины: моногр. / А.Е. Агапитов, Д.В. Пивень.](#) – 2-е изд., перераб. и доп. – Иркутск: РИО ГБОУ ДПО ИГМАПО, 2013. – 172 с.

© **Агапитов А.Е., Пивень Д.В.**, кафедра общественного здоровья и здравоохранения ГБОУ ДПО "ИГМАПО Минздрава России", **2013**

Веб-публикация: **Андрей Таевский** в составе проектов:

[ЭкспертЗдравСервис](#)

[Миссия профилактической медицины](#)

Все права защищены. При копировании материала ссылка на источник обязательна.