Категория: Терминология профилактической медицины

Просмотров: 3678

Диспансерный метод - прогрессивный и высоко эффективный медикосоциальный метод обеспечения ключевых задач здравоохранения.

Диспансерный метод направлен на раннее выявление различных форм
расстройств здоровья (донозологическая диагностика, диагностика
переходных состояний и нозологических форм) в сочетании с динамическим
контролем за эффективностью целевых корригирующих и лечебных
мероприятий (мониторинг курационной эффективности). Диспансерный метод
- активный социальный компонент организации и прогнозирования
отраслевой деятельности, позволяющий унифицировать и интенсифицировать
всю систему здравоохранения, формировать новые подходы к её
рационализации и повышению организационно-структурной эффективности.

Впервые диспансеризацию пытались провести ещё в 1930-е годы, однако это начинание не было реализовано. Вновь к идее ежегодной диспансеризации вернулись в 1980-е годы. Мероприятия проводились в соответствии с утверждённым Министерством здравоохранения СССР Порядком проведения всеобщей диспансеризации населения (приказ от  $30.05.1986\ r.\ N$  770). Первоначально принципы и методы диспансеризации использовались для борьбы с социально опасными болезнями – туберкулёзом, сифилисом, трахомой и др.

В последующем диспансерный метод нашёл применение для наблюдения за беременными, детьми, трудящимися ведущих отраслей промышленности и сельскохозяйственного производства, больными страдающими хроническими заболеваниями. Однако ежегодное всеобщее обследование населения оказалось весьма затруднительным, к тому же оно затрудняло работу поликлиник, так как не хватало ресурсного и организационного обеспечения.

Институт диспансеризации был возрождён, когда в национальный проект «Здоровье» была включена программа «Всеобщая диспансеризация работающего населения». Поскольку всё население охватить было невозможно, начать решили с работников, занятых во вредных и опасных условиях труда. Позднее в программу диспансеризации были включены граждане, работающие в государственных и муниципальных учреждениях сферы здравоохранения, социальной защиты, культуры, физической культуры и спорта, в научно-исследовательских учреждениях.

Впервые о выделении средств из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования ( $\Phi\Phi$ OMC) на диспансеризацию работающих граждан было сказано в федеральном законе от 22.12.2005 года № 171-ФЗ «О бюджете федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2006 год». Первоначально был установлен возраст работающих граждан, проходящих диспансеризацию, — 30-35 лет, но с 2007 г. возрастные ограничения были сняты. В 2008 г. был расширен перечень исследований. В 2009 г. граждане, прошедшие дополнительную диспансеризацию, впервые получили паспорт здоровья.

Категория: Терминология профилактической медицины Просмотров:

3678

Диспансеризация превентологическая (донозологическая) — метод медикопрофилактического динамического наблюдения за здоровыми лицами с целью
раннего предотвращения возникновения заболеваний (нозологических
форм), приводящих к временной нетрудоспособности, инвалидности,
смертности. Метод относится к первичной медицинской профилактике.
Применение во время диспансеризация специализированных (собственных)
методов превентологической (донозологической) диагностики позволяет
выявлять нозологические риски ещё на ранних стадиях формирования
дисфункций и адаптационного синдрома. В свою очередь, применение
методов нозологической диагностики позволяет проводить раннее
выявление уже существующих нозологических форм, что относит
нозологическую диагностику и нозологическую диспансеризацию к
компетенции вторичной медицинской профилактики.

Диспансеризация нозологическая — диагностические мероприятия, связанные с применением заведомо нозологических методов верификации и диагностики заболеваний, что автоматически относит нозологическую диспансеризацию не к первичной, а к вторичной медицинской профилактике (ВМП); например, измерение артериального давления тонометром с целью выявления у пациента артериальной гипертонии. Диспансеризация нозологическая определяется и по целевому характеру применяемого метода. Например, использование нозологического метода диагностики может привести только к постановке диагноза. Кроме того, нозологическая диспансеризация содержит характерные признаки решаемых в этом случае задач: раннее выявление нозологической формы направлено, прежде всего, на предупреждение его развития и предупреждение его осложнений.

\_\_\_

Опубликовано в составе монографии:

УДК 616-084

BBK 51.1(2)5

A23

<u>Терминология профилактической медицины</u>: моногр. / А.Е. Агапитов, Д.В. Пивень. – 2-е изд., перераб. и доп. – Иркутск: РИО ГБОУ ДПО ИГМАПО, 2013. – 172 с.

© Агапитов А.Е., Пивень Д.В., кафедра общественного здоровья и здравоохранения ГБОУ ДПО "ИГМАПО Минздрава России", 2013

Веб-публикация: Андрей Таевский в составе проектов:

## ..Термины и определения: Диспансерный метод, Диспансеризация превентологическая (дон

Категория: Терминология профилактической медицины

Просмотров: 3678

## <u>Эксперт3дравСервис</u>

## Миссия профилактической медицины

Все права защищены. При копировании материала ссылка на источник обязательна.